

چاودانه

www.chavdaneh.com

خوراک‌های تخصصی مرغ‌گوشتی‌صنعتی



ارتباط مستقیم با مشاورین تغذیه: ۰۹۱۳۸۰۳۱۱۹۳

نشانی کارخانه: شهرضا، کمربندی، جاده اختصاصی شرکت چاودانه

فکس: ۰۳۱-۵۳۳۰۹۰۱۲

تلفن: (۷خط) ۰۳۱-۵۳۳۰۹۰۱۱



سازمان تحقیقات و آموزش دامپزشکی



کد ۴۶۰
پایان دان ۲
(۴۲ روزگی تا کشتار)



کد ۴۷۰
پایان دان ۱
(۴۱-۳۷ روز)



کد ۴۸۰
میان دان
(۳۱-۲۳ روز)



کد ۴۹۰
پیش دان
(۲۲-۱۷ روز)



کد ۵۰۰
سوپرا ستارتر
(۱۱-۱ روز)

خوراک‌های تخصصی مرغ گوشتی صنعتی

مشخصات

17 ± 0.5	18 ± 0.5	19.2 ± 0.5	20 ± 0.5	24.3 ± 0.5	پروتئین خام (%) CP
3050 ± 10	3000 ± 10	2975 ± 10	2910 ± 10	2940 ± 10	انرژی قابل متابولیسم ME(kcal/Kg)
3.68 ± 0.2	3.50 ± 0.2	4.16 ± 0.2	3.67 ± 0.2	3.85 ± 0.2	چربی (%) EE
0.95 ± 0.2	1.03 ± 0.2	1.1 ± 0.2	1.25 ± 0.2	1.42 ± 0.2	لیزین (%) Lys
0.45 ± 0.2	0.49 ± 0.2	0.52 ± 0.2	0.56 ± 0.2	0.63 ± 0.2	متیونین (%) Met
0.71 ± 0.2	0.79 ± 0.2	0.86 ± 0.2	1.98 ± 0.2	1.01 ± 0.2	متیونین + سیستئین Met + Cys (%)
0.67 ± 0.2	0.72 ± 0.2	0.76 ± 0.2	0.84 ± 0.2	0.9 ± 0.2	ترونتونین (%) Thr
0.9 ± 0.2	1 ± 0.2	1 ± 0.2	1 ± 0.2	1.03 ± 0.5	کلسیم (%) Ca
0.4 ± 0.2	0.44 ± 0.2	0.47 ± 0.2	0.5 ± 0.2	0.5 ± 0.2	فسفر قابل جذب (%) P
3.30 ± 0.2	3.41 ± 0.2	3.57 ± 0.2	3.77 ± 0.2	3.7 ± 0.2	فیبر خام (%) CF
10 ± 1	10 ± 1	10 ± 1	10 ± 1	10 ± 1	رطوبت (%) M
روزانه ۲۰۰ گرم	۱۹۱۰ گرم	۱۲۵۵ گرم	۸۹۰ گرم	۲۰۰ گرم	مقادیر مصرف به ازای هر قطعه

- به غیر از خوراک پایان دان ۲ که میزان مصرف آن به صورت «روزانه» محاسبه شده است، میزان مصرف بقیه خوراک‌ها در هر «مرحله» برای یک قطعه جوجه می باشد.
- حتماً در طول دوره پرورش تا ۱۰ روز قبل از کشتار می بایست داروی ضد کوکسیدیوز به جیره اضافه شود و در خصوص نوع و تعداد آن با دامپزشک فارم یا کارشناسان شرکت چاودانه مشاوره گردد.

برنامه خاموشی مرغ گوشتی صنعتی

در سه هفته اول پرورش، چون رشد عضلانی جوجه از رشد اندامهای تنفسی و گردش خون سریعتر است، این عدم هماهنگی می تواند موجب مشکلاتی از قبیل مرگ ناگهانی در جوجهها گردد. رعایت خاموشی که جدول آن در اختیار شما قرار گرفته می تواند از رشد زیاد جوجه در این زمان جلوگیری نموده و عوارض رشد نامتعادل را از بین ببرد. این عمل ضمناً باعث استفاده بهتر از خوراک مصرفی در جوجه خواهد شد.

ساعت خاموشی (ساعت)	روشنایی (ساعت)	سن (روز)
-	۲۴	۲۴ ساعت اول
۱	۲۳	۵-۲
۸	۱۶	۱۴-۶
۶	۱۸	۲۱-۱۵
۴	۲۰	۲۸-۲۲
۲	۲۲	۳۵-۲۹
۱	۲۳	۳۶ به بعد

نکات کلیدی مربوط به برنامه خاموشی

- به محض روشنایی، آب و دان را در اختیار جوجه قرار دهید.
- از آنجائیکه آب و دان در دوره زمانی کوتاه در اختیار جوجه قرار می گیرد، بنابراین باید فضای دانخوری و آبخوری حتماً بر طبق استاندارد باشد.
- در صورت استفاده از دایمر (Dimer) برای ایجاد فلق و شفق مصنوعی مرحله انتقال از خاموشی به روشنایی و بالعکس را در عرض ۴۰-۵۰ دقیقه و حداقل در ۵ مرحله تکمیل نمایید.
- از غیر قابل نفوذ بودن سالن نسبت به نور خارجی (حداکثر ۴ درصد لوکس در دوره خاموشی) مطمئن باشید.

مختصات پیشنهادی می تواند تحت تأثیر شرایط مدیریتی و محیطی (اقلیم، نژاد، فصل، وزن و زمان ارائه به بازار) متغیر باشد؛ در نتیجه خواهشمند است در موارد خاص، برنامه ویژه فارم خود را از مشاورین شرکت چاودانه بخواهید تا بتوانید استراتژی پرورش خود را هر چه بهتر تعیین نمایید.

جهت عادت پذیری طیور، در پایان هر دوره به مدت چهار روز خوراک دوره قبل و بعد به صورت مخلوط مصرف گردد.

مواد اولیه مورد مصرف: ذرت، کنجاله سویا، گلو تن ذرت جامد، دی کلسیم فسفات، پریمیکس های ویتامینه و معدنی اختصاصی شرکت چاودانه